



Citrus
Fruits



برنامه غذایی مرکبات (محلول پاشی)

زمان مصرف	محصول	نحوه مصرف
ریشه دهی	Apomos	۱۰۰ گرم در هکتار / ۲۰۰ لیتر در آب
قبل از گلدهی	Multy various	۲ کیلوگرم در هکتار
	Amino acid	۱,۵ کیلوگرم در هکتار
	Apomos	۱۰۰ گرم در هکتار / ۲۰۰ لیتر در آب
گلدهی	Fruit set	۳ لیتر در هکتار
میوه دهی	Multy various	۲ کیلوگرم در هکتار
	Amino acid	۱,۵ کیلوگرم در هکتار
	Fruit set	۳ لیتر در هکتار
	Iproex	۱۰۰ گرم در هکتار / ۲۰۰ لیتر در آب
بزرگ شدن میوه	NPK ۰ . ۱۰ . ۵۱	۲ تا ۵ کیلوگرم در هکتار
	Iproex	۱۰۰ گرم در هکتار / ۲۰۰ لیتر در آب
تغییر رنگ	Ca - EDTA	۳ کیلوگرم در هکتار
	Iproex	۱۰۰ گرم در هکتار / ۲۰۰ لیتر در آب

برنامه غذایی مرکبات (آب آبیاری)



Citrus

نحوه مصرف	محصول	زمان مصرف
۵ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	Humic	ریشه دهی
۱۰ کیلوگرم در هکتار	Fe EDDHA	
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	Multy various	
۱۰۰ لیتر در آب / اگر در هکتار	Apomos	
۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	NPK ۱۰ . ۵۵ . ۵	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	Fe EDDHA	قبل از گلدهی
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	Multy various	
۱۰۰ لیتر در آب / اگر در هکتار	Apomos	
۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	NPK ۲۰ . ۲۰ . ۲۰	
۳۰ لیتر در هکتار	Anti salt	
۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	NPK ۲۰ . ۲۰ . ۲۰	گلدهی
۲۵ لیتر در هکتار	Anti salt	
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	Multy various	میوه دهی
۱۰۰ لیتر در آب / اگر در هکتار	Iproex	
۲۵ لیتر در هکتار	Anti salt	
۱۰ کیلوگرم در هکتار	Fe EDDHA	رویش میوه
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	Multy various	
۱۰۰ لیتر در آب / اگر در هکتار	Iproex	
۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	NPK ۲ . ۵ . ۵۰	
۲۵ لیتر در هکتار	Anti salt	

