برنامـــــه غـــذایـــی نخل خرما

(محلول پاشی و آب آبیـــاری)

زمـــان مصـــرف	محصـــــول	تـــوضیـــحات
اواسط زمستان	**Anti salt** ۱۵۰-۳۰۰ cc/۱۰ L در آب آبیاری ۵۰ - ۱۲۰L / ha	خاک هایی که آهکی، قلیایی و شور هستند برای اصلاح آن از آنتی سالت استفاده میکنیم.
اواخر زمستان تا اوایل بهار- قبل از گرده افشانی و ظهور گل آذین	**Humic** ۵ تا ۶ kg/ha آب آبیاری **NPK ۱۰ . ۵۵ .۵** در سال آبیاری ۱۰۰kg/ha **Apomos** ۱۰۰gr/ha در ۱۰۰ لیتر آبی آبیاری **Multi** ۲kg/ha محلول پاشی **Fruit set** ۲-۳ L / ha محلول پاشی	در صورتی که خاک سبک و شنی باشد برای افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در خاک از هیومیک استفاده شود. برای آماده سازی گیاه برای مرحله گلدهی از کود فسفر بالا استفاده می شود و با محرک رشد گلدهی تشکیل گل آذین و کیفیت آن را افزایش دهیم. ریزمغذی های مولتی موجب تقویت گل ها و افزایش قدرت لقاح می شوند و فروت ست درصد تلقیح موفق و تثبیت گل و میوه را موجب می شود.
اوایل تا اواسط بهار - بعد از ظهور گل آذین	**کود مخصوص نخل** ۱۵۰ gr/ha به اجزای هر سال سن درخت **NPK ۲۰ . ۲۰ .۲۰** در سال آبیاری ۱۰۰kg/ha	کود مخصوص نخل گل ها و شاخه گل آذین را تغذیه کامل می کند و مقاومت و درصد تشکیل میوه را افزایش میدهد. کود سه بیست تغذیه ای سریع و عمومی میدهد و موجب رشد اولیه میشود.
اواسط بهار تا تابستان - میوه دهی	**NPK ۱۲ . ۱۲ .۳۶** در سال آبیاری ۱۰۰kg/ha **NPK ۲ . ۵ .۵۰** ۳kg/ha محلول پاشی **Amino acid** محلول پاشی ۲kg/ha - ۲,۵ **کلات Ca** ۲ kg / ha محلول پاشی	کود پتاس بالا در این مرحله باعث افزایش قند، درشتی، مقاومت به گرما و بیماری و کاهش ریزش میوه نیز میشود. در مرحله خارک آمینو در کنار پتاس بالا محلول پاشی میشود که تاثیر بسزایی روی تبدیل خارک به میوه رسیده دارد. ابتداد ۱۲،۱۲،۳۶ استفاده میشود، سپس از ۲،۵،۵۰ همراه آمینو استفاده میشود. کلسیم روی بهبود بافت میوه و استحکام نقش بسزایی دارد.

Date palm